


RPQ

- Il *Resilience Process Questionnaire* (RPQ) è uno strumento di misurazione della resilienza, ovvero la capacità del soggetto di sollevarsi dopo un trauma, superarlo e, possibilmente, utilizzarne gli aspetti positivi come elementi di crescita individuale.
- Si articola in tre dimensioni, ciascuna delle quali raggruppa competenze e risorse diverse nella gestione di eventi traumatici:
 1. **Reintegrazione con Perdita o Disfunzionale (RPD)** che si realizza quando il soggetto adotta risposte inadeguate al fronteggiamento del disagio, come uso di sostanze stupefacenti, abuso d'alcool o attuazione di comportamenti distruttivi per evitare il fronteggiamento delle avversità.
 2. **Reintegrazione Resiliente (RR)** che si riferisce al processo di coping che determina una reale crescita dell'individuo, con comprensione di se stessi e sviluppo, dunque, di competenze resilienti.
 3. **Ritorno all'Omeostasi (RO)** che consiste in un ritorno alla originaria condizione di equilibrio, di seguito ad un evento spiacevole.

Analisi dei risultati

- I dati sono stati analizzati, facendo una media di quelli che sono gli incrementi (o i decrementi) dei punteggi ottenuti dai ragazzi ai test
- In pratica si tratta di sottrarre al punteggio ottenuto da ogni ragazzo alla seconda somministrazione, quello della prima.
- Poi si sono calcolate le medie di tali incrementi (o decrementi) sia per il gruppo sperimentale che per quello di controllo
- Infine si passa ad analisi statistica tali medie, per vedere se differiscono fra loro in maniera statisticamente significativa (e quindi se c'è una differenza promossa dalle attività inserite nel percorso)


Risultati



- I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa fra gruppo sperimentale e di controllo per quel che riguarda le dimensioni di:
- **Reintegrazione con Perdita o Disfunzionale (RPD)**
- **Reintegrazione Resiliente (RR)**
- **Ritorno all'omeostasi (RO)**

Risultati


3° Secondaria Secondo Grado



- I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa fra gruppo sperimentale e di controllo per quel che riguarda le dimensioni di:
 - **Reintegrazione con Perdita o Disfunzionale (RPD)**
 - **Reintegrazione Resiliente (RR)**

Risultati


1° Secondaria Secondo Grado



- I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa fra gruppo sperimentale e di controllo per quel che riguarda le dimensioni di:
 - **Reintegrazione con Perdita o Disfunzionale (RPD)**
 - **Reintegrazione Resiliente (RR)**
 - **Ritorno all'omeostasi (RO)**

Risultati

2° Secondaria Secondo Grado



- I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa fra gruppo sperimentale e di controllo per quel che riguarda le dimensioni di:
- **Reintegrazione con Perdita o Disfunzionale (RPD)**
- **Reintegrazione Resiliente (RR)**
- **Ritorno all'omeostasi (RO)**